


Difteria

¿Qué es? _____

Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Corynebacterium diphtheria*, que infecta principalmente la garganta y vías respiratorias superiores, y produce una toxina que afecta a otros órganos.



Signos y síntomas

La enfermedad tiene un inicio agudo y el cuadro clínico consta de:

- Dolor de garganta.
- Fiebre baja.
- Glándulas inflamadas en el cuello.
- En los casos graves, puede causar miocarditis o neuropatía periférica.



La toxina diftérica puede causar que una membrana de tejido muerto se acumule sobre la garganta y las amígdalas, dificultando la respiración y la deglución.

Modo de transmisión

La enfermedad se transmite a través del contacto físico directo o de la inhalación de las secreciones aerosolizadas por tos o estornudos de personas infectadas o un portador **(persona que porta la bacteria, pero no padece la enfermedad)**. En el caso de la difteria cutánea, por contacto con artículos contaminados con las secreciones de las personas infectadas.



Período de incubación

Es de 2 a 5 días, con un intervalo de 1 a 10 días.



Período de transmisibilidad

Es variable; las personas no tratadas son infecciosas durante 2 a 4 semanas, y aquellas que han recibido tratamiento de 2 a 4 días. Los portadores asintomáticos, pueden expulsar microorganismos durante 6 meses o más.

Inmunización y vacunas contra la difteria

La vacuna contra la difteria es un toxoide bacteriano, es decir una toxina cuya toxicidad ha sido inactivada. La DPT es la clásica combinación que se utiliza actualmente en Colombia con un esquema de cuatro dosis (a los 2,4,6 y 18 meses) y un refuerzo a los cinco años.

